

BANANEIRA DE CAMUTANGA

REGIONAL : CARPINA

MUNICÍPIO :CAMUTANGA

RESPONSÁVEL : JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO

EMAIL : JOSEMSFIPA@HOTMAIL.COM

AGRICULTORES: MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL GONÇALVEZ DE SOUZA, JOSE ALVEZ DA SILVA, SILVÂNIO ALVEZ DA SILVA, REGINADO PEDRO DA SILVA E JOSÉ ELEIZER DA SILVA.

- trabalho surgiu com a necessidade de diminuir o uso de produtos químicos (herbicidas e inseticidas) reduzindo os custos dos tratamentos culturais que requer a cultura.
- Observamos que em algumas propriedades o trips , mal – do – Panamá e Sigatoka amarela estão presentes ; recomendamos no caso do Trips , a eliminação dos restos florais do engajo de 15 a 20 dias após a emissão da inflorescência. Com relação ao mal – do – Panamá , recomendamos a eliminação da planta doente e o plantio de variedades resistentes. Ex: RBS Princesa ou Tropical, enquanto que na Sigatoka amarela , recomendamos o plantio da variedade Pacovan Ken.
- Aconselhamos o plantio de quebra – ventos para diminuir os danos as folhas , Ex: Eucalipto e Bambu.
- Orientamos no sentido de proteger o solo , fazendo apenas o coroamento da planta e roçando a rua ; não esquecer de deixar por 90 dias o peço do caule em pé após o corte do cacho, para que as plantas filhas e netas absorvam as reservas nutricionais encontradas na planta mãe.

Os resultados estão sendo favoráveis .

Os agricultores estão colhendo bananas limpas ,sadias sem sintomas do trips , decidiram plantar no próximo inverno variedades resistentes a Sigatoka amarela e ao Mal – do – Panamá.