

Vegetação e flora de uma área de caatinga nos Cariris Velhos (semi-árido nordestino), Brasil

Rita de Cássia Araújo Pereira, Maria José de Araújo Lima e Ana Luíza Du Bocage Neta

Resumo

A vegetação de caatinga na região circunvizinha ao açude de Soledade - PB. apesar de encontrar-se bastante devastada, principalmente pela exploração irracional empreendida pelas atividades produtivas, mostrou-se, nas áreas estudadas, com aspectos de uma floresta caducifólia espinhosa e, em outras localidades, com características de uma comunidade aberta subarbustiva. O levantamento da flora da região registrou a presença de 40 famílias, com cerca de 109 espécies. Das famílias encontradas, as de maiores representatividades foram: Leguminosae, com 20 espécies, Asteraceae com 13, Eufhorbiaceae com 10 e Cactaceae com 07.

Vegetation and flora of "caatinga" area at the "Cariris Velhos" (semi-arid of Northeast), Brazil

Abstract

The native vegetation "caatinga" in neighborhood area of the Soledade reservoir, at Paraíba State, Brazil in spite of to be found very divested, due to irrational exploration in the agriculture activities, have showed many areas with some aspects that indicated a caduceus forest and in other places with some characteristics of a vegetative community of subarboreus. The survey of the vegetation community of the zone evidenced the presence of the 40 families with at least 109 species. Among the families found more emphasis was for Leguminosae with 20 species, Asteraceae with 13, Eufhorbiaceae with 10 and, finally, Cactaceae with 07