

## A tribo Helianthea Cassini (Asteraceae) no Estado de Pernambuco – Brasil

Rita de Cássia Araújo Pereira

### Resumo

O presente trabalho consta de uma análise geral dos representantes da tribo Heliantheae Cass. (Asteraceae) encontrados no Estado de Pernambuco. Estudou-se as espécies nativas e as exóticas cosmopolitas, com exceção dos gêneros essencialmente cultivados. A pesquisa foi efetuada através da investigação de material fresco, coletado em vários locais do Estado, e da análise de exsiccatas. No tratamento taxonômico da tribo apresenta-se única chave para identificação dos gêneros e outras para separação das espécies. Incluem-se descrições de cada representante e informações sobre distribuição geográfica, importância econômica, nomes vulgares, entre outras, além de ilustrações, pormenorizadas das espécies. Foram registrados 26 gêneros e 33 espécies com ocorrência desde as regiões mais secas das caatingas até as mais úmidas da zona da mata. Na zona da mata e zona das caatingas, sub-zonas do agreste e sertão foram identificadas as seguintes espécies: *Acanthospermum hispidum* DC.; *Melanthera latifolia* (Gardn.) Cabr.; *Wulffia baccata* (L. f.) Kuntz.; *Eclipta prostrata* (L.) L.; *Blainvillea rhomboidea* Cass.; *Verbesina macrophylla* (Cass.) Blake; *Bidens pilosa* L. e *B. bipinnata* L.; *Cosmos sulphureos* Cav.; *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke; *Spilanthes acmella* (L.) Murr.; *Delilia biflora* (L.) Kuntz. e *Wedelia villosa* Gardn. Na zona da mata e sub-zona do agreste foi encontrada *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. Citam-se para as sub-zonas do agreste e sertão *Lagascea mollis* Cav.; *Enhydra rivularis* Gardn.; *Simsia dombeyana* DC.; *Galinsoga parviflora* Cav.; *Isocarpha megacephala* Matt. e *Wedelia alagoensis* Baker. Verificou-se a presença em áreas da mata e sertão de *Ambrósia elatior* L. e *Aspilia martii* Baker. Com desenvolvimento exclusivo na zona da mata observou-se: *Acanthospermum australe* (Loefl.) O. Kuntz.; *Melampodium divaricatum* (L.C.Rich.) DC.; *Eleutheranthera ruderalis* (Swartz) Schultz-Bip.; *Synedrella nodiflora* (L.) Gaerth.; *Ichthyothere cunabi* Mart. e *Ambrosia microcephala* DC. Enquanto na sub-zona do agreste citam-se *Zexmenia aff. scaberrima* Benth.; *Baltimora recta* L. e *Parthenium hysterophorus* L. Unicamente na sub-zona do sertão encontrou-se *Blainvillea lanceolata* Baker e *Wedelia goyazensis* Gardn. Constituem primeira referência para este Estado as espécies *Blainvillea lanceolata*; *Eleutheranthera ruderalis*, *Zexmenia aff. scaberrima*; *Galinsoga parviflora*; *Simsia dombeyana*. *Ambrósia microcephala*; *Parthenium hysterophorus*; *Baltimora recta*; *Wedelia alagoensis*; *Wedelia goyazensis*; *Wedelia villosa*.